

### 3급 부정교합의 수술교정, 언제 어떻게 할까?

김 병 호 / 웃는내일치과의원

골격간격을 극복하는 교정치료 기술의 발전으로 인해 골격성 3급 부정교합 환자에서 비수술적 치료를 선택하는 비율이 증가하고 있다. 따라서 진단시 수술과 비수술의 경계선에 있는 환자들의 비율도 높아지고 있으며, 수술 여부의 결정시 교정의사는 임상적 요소와 함께 치료 외적인 요소 즉 환자의 주관적인 기대도 함께 고려해야 한다.

어렵게 수술을 결정한 경우 환자는 더 높은 기대를 가지게 되므로 교정의사와 외과의사도 일반인의 평균이 아닌 높은 수준의 치료목표를 설정하고 그것을 달성하기 위한 최선의 노력을 시행하게 된다.

본 연제에서는 임상에서 수술이 필요해 보이는 환자를 만났을 때 고려해야 할 사항들을 치료 진행의 순서에 따라 다뤄보고자 한다.

턱교정수술이 반드시 필요한 증례들

1. 수술교정시 달성하고자 하는 치료목표
2. 술전 교정 계획시 발치와 비발치의 결정 방법
3. 수술 전 교정 주치의가 해야 할 과정
4. 수술 후 교정 주치의가 해야 할 과정

학력 및 약력

- \* 서울대학교 치과대학 졸업 및 동대학원 석사 및 박사
- \* 서울대학교 치과병원 교정과 수련 및 전임의
- \* 대한치과교정학회 고향학술상 수상
- \* 대한치과교정학회 부회장
- \* 현, 웃는내일치과교정과치과의원 원장